

Skala Dutch Lipid Clinic Network

WYWIAD KLINICZNY

- | | |
|---|-------|
| 1. Przedwczesna choroba wieńcowa (mężczyźni <55 r.ż., kobiety <60 r.ż.) | 2 pkt |
| 2. Przedwczesna choroba naczyń mózgowych i obwodowych | 1 pkt |

WYWIAD RODZINNY

- | | |
|--|-------|
| 1. Krewni I stopnia z przedwczesną chorobą wieńcową lub naczyniową | 1 pkt |
| 2. Krewni I stopnia ze stężeniem cholesterolu LDL >190 mg/dl | 1 pkt |
| 3. Krewni I stopnia z żółtakami ścięgien i/lub rąbką rogówkowym | 2 pkt |
| 4. Dzieci i młodzież <18 r.ż. ze stężeniem cholesterolu LDL >150 mg/dl | 2 pkt |

BADANIE PRZEDMIOTOWE

- | | |
|------------------------------|-------|
| 1. Żółtaki ścięgien | 6 pkt |
| 2. Rąbek rogówkowy < 45 r.ż. | 4 pkt |

BADANIE LABORATORYJNE

- | | |
|--|-------|
| 1. Cholesterolu LDL >8,5 mmol/l (330 mg/dl) | 8 pkt |
| 2. Cholesterolu LDL 6,5-8,4 mmol/l (250-329 mg/dl) | 5 pkt |
| 3. Cholesterolu LDL 5,0-6,4 mmol/l (190-249 mg/dl) | 3 pkt |
| 4. Cholesterolu LDL 4,0-4,9 mmol/l (155-189 mg/dl) | 1 pkt |

BADANIE GENETYCZNE

- | | |
|--------------------------------------|-------|
| 1. Mutacja genu LDLR, APOB lub PCSK9 | 8 pkt |
|--------------------------------------|-------|

Sumuje się jedną najwyższą wartość punktową z każdej grupy.

ROZPOZNANIE HIPERCHOLESTEROLEMII RODZINNEJ

W zależności od osiągniętej ilości punktów ryzyko choroby określa się jako:
możliwe, prawdopodobne lub pewne.

PEWNE >8 pkt

MOŻLIWE 3-5 pkt

PRAWDOPODOBNE 6-8 pkt

NIEPOTWIERDZONE <3 pkt